



ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Разходно количество/ха/апликация: 1,5 кг с 300 литра вода (0,5 %)

ПАНАМИН трябва директно преди употребата да се разтвори в по-малко количество вода в отделно ведро и след това да се налее бавно във вече напълнения поне до половината резервоар на пръскачката. Бъркалката трябва да е в движение, за да се предотврати образуването на утайка. Разтворът да се използва в рамките на 4 часа. След това се разпръсква с обичайната техника фино като мъгла с размер на дюзите по-малък от 0,3 мм. и налягане 4 - 6 bar. След употреба филтрите, дюзите и резервоарът се почистват основно. Може да се прилага в комбинация с други торове и средства за растителна защита, с изключение на такива на киселинна основа и $\text{pH} < 3.4$. Препоръчва се предварителна проба на смесване преди това. В традиционното земеделие могат да бъдат спестени до 100 % от фунгицидите, т.е. да се използват само в абсолютен случай на необходимост. В биологичното земеделие наред с PANAMIN не са необходими повече други, допълнителни продукти.

ЗЕМЕДЕЛИЕ	Първа употреба	Следващи употреби
Зимни житни култури	ВВСН 13 При възобновяване на активната пролетна вегетация	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Летни житни култури	ВВСН 13 3 - 6 листов стадий	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Царевица	ВВСН 13 Височина на растеж 10 - 15 cm	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Соя	ВВСН 13 Височина на растеж 10 - 15 cm	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Слънчоглед	ВВСН 12-14 3 - 6 листов стадий	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Зимна рапица	ВВСН 13 При възобновяване на активната пролетна вегетация	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Лятна рапица	ВВСН 13 3 - 6 листов стадий	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно
Картофи	ВВСН 13 Височина на растеж 10 - 15 cm	II и III - на 10 - 14 дневен интервал, IV - опционално
Захарно цвекло	ВВСН 12-14 Височина на растеж 10 - 15 cm	II и III - на 10 - 14 дневен интервал, IV - опционално
Маслена тиква	ВВСН 12-14 Височина на растеж 10 - 15 cm	II и III - на 10 - 14 дневен интервал, IV - опционално
Ориз	ВВСН 13 3 - 6 листов стадий	II - 10 - 14 дни по-късно, при необходимост III - 10 дни по-късно

ВИНАРСТВО	Първа употреба	Следващи употреби
Грозде	ВВСН 11 - 13 Стадий "мише ухо - пеперуда"	II - преди цъфтеж III - след цъфтеж, IV до VI на интервал от 10 - 14 дни VII до X при необходимост на интервал от 10 - 14 дни

ОВОЦАРСТВО	Първа употреба	Следващи употреби
Плодове със семки и костилки	ВВСН 11- 15 Развитие на листа, развитие на издънки	II – преди цъфтеж, III след цъфтеж, IV и V на 10-14 дневен интервал, VI – при необходимост
Ягодоплодни	ВВСН 11- 15 Развитие на листа, предцъфтежно	II – образуване на завръз, III и IV нарастване на плода на 10-14 дневен интервал, V - опционално
Маслини	ВВСН 15 – 31 Развитие на листа, развитие на издънки	II до IV на 14 дневен интервал, V- опционално
Цитрусови плодове	ВВСН 11 – 15 Развитие на листа, развитие на издънки	II до V на 14 дневен интервал, VI - опционално

ЗЕЛЕНЧУЦИ	Първа употреба	Следващи употреби
Кромид лук, кореноплодни растения	ВВСН 11 – 13 5 – 10 см. височина	II до IV на 14 дневен интервал, V -опционално
Бобови растения	ВВСН 13 5 – 10 см. височина	II преди цъфтеж, III след цъфтеж, IV след 10 – 14 дни, V -опционално
Краставици, домати, чушки, патладжани	ВВСН 13 5 – 10 см. височина	II преди цъфтеж, III след цъфтеж, IV и V при нарастване на плода на 10 – 14 дневен интервал, VI - опционално
Листни зеленчуци	ВВСН 13 4 – 6 листа	II и III на 10 - 14 дневен интервал, IV -опционално
Зеле и зелени образуващи глави	ВВСН 13 4 – 6 листа	II – образуване на розетка, III след 10 - 14 дни, IV - опционално