

ИНСТРУЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА PANAMIN®:

- PANAMIN® се разбърква бавно в камерата за наливане, като преди това резервоарът трябва да е напълнен наполовина.
- Пръскачката трябва **постоянно** да се движи с работещ смесител или бъркалка.
- Дозировка: за 1 хектар 1,5 kg PANAMIN® се разтварят в 300 литра вода (5 грама на 1 литър = 0,5% концентрация)
- Третирането се извършва с обикновена пръскачка с налягане 4 - 6 bar и размер на дюзите по-малък от 0,3 mm.
- Не са необходими прилепители и овлажнители.
- Скорост на третиране: идеална при 5 - 8 Km/h, скорост на вятъра по-малка от 3 - 5 m/s
- Ако PANAMIN® се прилага заедно с други торове или средства за растителна защита, PANAMIN® се прибавя последен.
 - В общия случай PANAMIN® може да се смесва с всички обичайни торове и средства за растителна защита, но рН-стойността на тези препарати никога не трябва да е **ПО-НИСКА** от 3,4!
 - Опитът показва, че през последните години нападенията от болести и вредители се увеличават. Затова не може да се даде точно съотношение при смесване на PANAMIN® с фунгициди и инсектициди. PANAMIN® GmbH препоръчва преди употребата на фунгициди и/или инсектициди, да се консултирате с агроном, за да приложите не само правилното количество, но и правилното съотношение на смесване.
 - При употребата на хербициди и фунгициди заедно с PANAMIN® внимавайте за рН-стойността. Ако киселинността на хербицидите и фунгицидите е много висока (<рН 3,4), сместа може да се разпени и да стане неизползваема!

ВАЖНО	Почистете щателно филтрите, дюзите и резервоара преди и след третирането!
ВАЖНО	Не смесвайте със силно „кисели“ препарати (рН<3,4)!

Това е камера за наливане

