




# Fulvic START



Фулвинови  
киселини

Хуминови  
киселини



Органично  
вещество



## PANATOR FULVIC START

- **Иновативен микс с две основни предназначения:**

- › За третиране на семена
- › Листно приложение в най-ранна фаза на развитие на посевите.
- › Балансираното съотношение на фулвинови и хуминови киселини, аминокиселини, фосфор (P) и високото съдържание на цинк (Zn), манган (Mg) и мег (Cu) имат силно стимулиращо действие от покълване на семената и начало на братене.

- **Хумусните киселини допринасят за:**

- › Трансформирането на хранителните вещества в достъпна за растенията форма
- › Абсорбират влагата и стимулират кълняемостта.

- **Комбинацията на фосфор (P) и силно концентрираните цинк (Zn), манган (Mn) и мег (Cu) стимулират:**

- › Вкореняването и братенето в най-важният етап от развитието на културите.
- › Резултатът е дружно поникване, добре развита коренова система, повишен здравен статус и запазване на добивният потенциал в момента на формирането му.

**Panator Fulvic Start е бюджетно решение за всяко стопанство.**

<b>Fulvic START®</b> www.panamin.bg		
<b>СЪСТАВ</b>		
Фосфорен пентаоксид (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5,80 %	
L - аминокиселини	5,80 %	
Фулвинови и Хуминови киселини	2,32 %	
Органично вещество в сухо вещество	70,41 %	
Органичен въглерод	3,48 %	
<b>МИКРОЕЛЕМЕНТИ</b>		
Цинк (Zn) EDTA	0,58 %	
Манган (Mn) EDTA	0,58 %	
Мед (Cu) EDTA	0,23 %	
Молибден (Mo) EDTA	0,06 %	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА</b>		
Плътност	1,12 ± 0,2 % kg/L	
pH стойност	6,5	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>		
Листно	100 - 150 мл/дка	
Почвено	600 - 800 мл/дка	
Есенници - начало на братене от образуване на розетка	на 10 - 14 дневен период	
Пролетници - начало от 3-5 лист 2 - 3 двойка листа	на 10 - 14 дневен период	
Трайни насаждения - начало след цъфтеж	на 10 - 14 дневен период	
Зеленчуци - начало: преди, след презасаждане на 10-15 см височина	на 10 - 14 дневен период	
Третиране на семена	Зърнени култури	1,5 - 2 L/1000 kg семена
	Царевица	5 L/1000 kg семена
	Слънчоглед	7,5 L/1000 kg семена



### PANATECHNOLOGY ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

**Panator Fulvic Start 50-150 мл./gka + Panamin Suspension 100-200 мл./gka или Panator Alga Max 50-100 мл./gka; Panator BLOOM 100-150 мл./gka; Panator Amino Zn 100-150 мл./gka.**